

AUTOPLASME VAILLANT ®

Sinapisme en cataplasme

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE

COMPOSITION

POUDRE DE GRAINE DE MOUTARDE NOIRE DESHUILEE21g

Excipient : poudre de graine de lin déshuillée.

Enveloppe externe : formée d'une face en « non tissé » et d'une face en papier kraft et polyester.

Pour 38g de sinapisme.

FORME PHARMACEUTIQUE

Sinapisme en cataplasme, sachet de 3.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

REVULSIF (R. Système respiratoire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est utilisé comme décongestionnant au cours des affectations respiratoires banales (rhumes, toux, bronchites simples) chez l'adulte.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de réaction cutanée de type allergique ou irritatif, arrêter le traitement
- Si la sensation de chaleur devient trop vive, il est conseillé d'arrêter le traitement
- En cas de fièvre, d'écoulement nasal purulent, d'expectoration purulente, **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN**
- Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies
- Ne pas faire d'applications trop prolongées (20 minutes maximum)
- Se laver soigneusement les mains après usage

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

- Allergie au produit,
- Maladies et lésions de la peau

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas d'applications prolongées, l'apparition de brûlures est possible.

GROSSESSE – ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

RESERVE A L'ADULTE.

Appliquer un à deux cataplasmes par jours.

Voie cutanée.

- Tremper l'autoplasme pendant quelques instants dans l'eau froide ou tiède (inférieure à 40°C). Le poser au niveau du thorax, du dos, du cou (éviter les seins). Le maintenir avec une serviette sèche.
- Laisser agir selon la tolérance du malade, jusqu'à ce que la peau prenne une coloration rouge et qu'une sensation de chaleur soit ressentie (8 à 20 minutes maximum).
- Révulsion obtenue, retirer l'autoplasme.

Ne pas dépasser 48 heures de traitement.
Si les troubles persistent, consultez votre médecin.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : possibilité d'irritation locale, de brûlures, et de réaction allergique. Par ailleurs, il existe une rougeur cutanée normale au point d'application.
NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR
A conserver à l'abri de l'humidité

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

septembre 2005

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Laboratoires OMEGA PHARMA France - Usine de Palluat - 07110 LARGENTIERE

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. - Immeuble Le Triton - 5 rue du Gabian - 98000 MONACO

8019 350 001-0