

BLACKOIDS DU DR MEUR ®

Pastille à sucer

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

COMPOSITION

LEVOMENTHOL.....	1.40 mg
EXTRAIT AQUEUX SEC DE REGLISSE.....	97.02 mg
(quantité correspondant en acide glycyrrhizique).....	7.70 mg
Excipients : maltodextrine 30 E, maltodextrine 005	

pour une pastille à sucer de 140 mg.

FORME PHARMACEUTIQUE

Pastille à sucer en sachet de 20 g ou en boîte de 20 g

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

A VISEE ANTISEPTIQUE (R : système respiratoire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé pour soulager les irritations de la gorge.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir compte de la teneur en acide glycyrrhizique (7.70 mg) par pastille, dans le cas d'autres apports en réglisse (boisson, confiseries). En cas de survenue de fièvre et / ou en cas d'apparition de nouveaux troubles (maux de gorge ou de tête importants, d'expectorations (crachat) purulentes, d'une gêne à la déglutition des aliments...) : CONSULTEZ VOTRE MEDECIN. Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée. EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. En cas d'épilepsie ancienne ou récente, DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Chez l'enfant de moins de 6 ans,
- Antécédents d'allergie au menthol ou aux autres composants de la pastille,
- Hypertension artérielle en raison de la présence de suc de réglisse

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament contient du menthol et du suc de réglisse. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associer pas afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées. (Voir posologie et mode d'administration).

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

Cette spécialité contient des dérivés terpéniques qui peuvent entraîner à doses excessives des accidents neurologiques à type de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant. Respecter les posologies et la durée de traitement préconisés. (Cf. rubrique POSOLOGIE)

GROSSESSE – ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament. En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Adulte : 10 à 20 pastilles par jour – posologie maximale 20 pastilles jour.

Enfant de 6 à 15 ans : 5 à 10 pastilles par jour – posologie maximale 10 pastilles jour

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE : IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS, NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Laisser fondre lentement les pastilles dans la bouche sans les croquer. Voie buccale.

Ne pas utiliser ce médicament de façon prolongée.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : éruptions cutanées : dans ce cas arrêtez le traitement.

En raison de la présence de dérivés terpéniques et en cas de non respect des doses préconisées :

- Risque de convulsions chez le nourrisson et chez l'enfant
- Possibilité d'agitation et de confusion chez les sujets âgés.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur. Conserver à une température inférieure à 25°C.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

octobre 2002

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. – Immeuble Le Triton - 5 rue du Gabian - 98000 MONACO

3109 140 001-1