

BRONCHODERMINE ®

Pommade

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 30 MOIS

COMPOSITION

CINEOLE*	1,000 g.
GAÏACOL CREOSOTE**	1,550 g.
HUILE ESSENTIELLE DE PIN RECONSTITUEE	1,000 g.

Excipients : stéarate de propylène glycol, stéarate d'éthyl, stéarate de glycol, stéarate de glycéryle, acide stéarique, monoéthanolamine, huile d'arachide, eau purifiée. Pour 100 g.

* = eucalyptol - ** = mélange de gaïacol (60 pour cent) et de créosote de hêtre (40 pour cent)

FORME PHARMACEUTIQUE

Pommade, tube de 60 g, avec dispositif doseur

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

MEDICAMENT A VISEE DECONGESTIONNANTE (R. Système respiratoire)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé comme décongestionnant au cours des affections respiratoires banales (rhumes, toux, bronchites simples).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Bien se laver les mains après usage afin d'éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies.
- En cas de fièvre, de crachats purulents ou d'aggravation des symptômes, consultez votre médecin.
- En cas d'épilepsie ancienne ou récente, demander conseil à votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants :

- allergie à l'un des constituants,
- lésions de la peau,
- enfant de moins de 30 mois,
- enfant ayant des antécédents de convulsions fébriles ou non.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPÉCIALES

Cette spécialité contient des terpènes qui peuvent entraîner à dose excessive, des accidents neurologiques à type de convulsions, chez l'enfant.

Respectez les conseils d'utilisation :

- ne pas appliquer sur une surface étendue du corps,
- ne pas dépasser la dose et la durée de traitement préconisées (Cf. rubrique POSOLOGIE).
- ne pas utiliser chez l'enfant de moins de 30 mois,
- respectez la posologie en fonction de l'âge et utiliser le dispositif doseur.
- En cas de réaction cutanée de type allergique ou si la sensation de chaleur devient trop vive, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre.

En cas d'allaitement, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament et ***en aucun cas il ne devra être appliqué sur les seins.***

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS.

Stéarate de propylène glycol.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Utiliser le **dispositif doseur** permettant de contrôler la quantité de pommade délivrée.

Enfant de 30 mois à 6 ans : 1 g de pommade, **une seule fois par jour.**

Enfant de 6 ans à 15 ans : 1 g de pommade, **2 fois par jour maximum.**

Adulte : 1,7 g de pommade, **2 fois par jour maximum.**

Se laver les mains après utilisation. Laver le dispositif doseur après utilisation.

Voie cutanée. Ne pas avaler.

Pour mesurer la dose à appliquer, utiliser le dispositif doseur en plastique fourni avec le tube. La dose étant choisie en fonction de l'âge, étaler la pommade sur la poitrine avec le bout des doigts. Ne pas frictionner ni masser.

Ne pas recouvrir avec un linge.

Se laver les mains après application. Laver le dispositif doseur après utilisation.

Ne pas dépasser 4 à 6 jours de traitement sans avis médical.

EFFETS INDESIRABLES

CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

– Possibilité d'irritation locale et d'allergie.

– En raison de la présence de dérivés terpéniques (eucalyptol, huile essentielle de pin) et **en cas de non respect des doses préconisées :**

– possibilité d'agitation, de confusion chez les sujets âgés,

– risque de convulsion chez l'enfant.

NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE

juin 2004

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. - Immeuble Le Triton - 5, rue du Gabian - 98000 Monaco

B 7009 140 001-2