

MAGNESIUM GLYCOLLE LAFARGE ®

Comprimé pelliculé

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

COMPOSITION

– LACTATE DE MAGNESIUM DIHYDRATE (quantité exprimée en magnésium) 50 mg
– GLYCINE 190 mg
Excipients : polyvidone K30, amidon de maïs pré-gélatinisé, stéarate de magnésium, talc, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol 400. Pour un comprimé pelliculé. La teneur totale en magnésium-élément est de 50 mg (2mmol) par comprimé.

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé, boîte de 40, 50 et 80.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

SUPPLEMENT MINERAL (A. Appareil digestif et métabolisme)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les carences en magnésium confirmées par votre médecin.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CE MEDICAMENT EST RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS. Il existe des spécialités plus adaptées à l'enfant de moins de 6 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE lors de certaines maladies des reins.

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE, sauf avis contraire de votre médecin, en cas de traitement par les quinidiniques.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment avec les quinidiniques, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE – ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. L'utilisation de ce médicament est à éviter pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.

Chez l'adulte : 6 à 10 comprimés par jour à répartir en plusieurs prises.

Chez l'enfant de plus de 6 ans (environ 20 kg) : 4 à 8 comprimés maximum par jour à répartir en plusieurs prises.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

– IL NE PEUT ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS

– NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

VOIE ORALE

Les comprimés sont à avaler tels quels avec un grand verre d'eau.

Le traitement sera interrompu dès que la quantité de magnésium dans le sang sera revenue à la normale.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS, notamment diarrhées, douleurs abdominales.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

août 1998.

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. - Immeuble Le Triton - 5 rue du Gabian – 98000 MONACO

B 5409 140 001-4