

PARLAX[®]

Solution buvable

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS

COMPOSITION

PARAFFINE LIQUIDE..... q.s.p. la contenance du modèle-vente

FORME PHARMACEUTIQUE

Solution buvable, flacon de 500 ml

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

MEDICAMENT LAXATIF A ACTION MECANIQUE, LUBRIFIANT (A06A)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est préconisé dans les constipations occasionnelles.

Il agit habituellement 6 à 8 heures après la prise

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Cette huile ne doit pas être chauffée
- L'utilisation prolongée de l'huile de paraffine est susceptible de diminuer l'absorption de certaines vitamines.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL

L'administration d'huile de paraffine chez le jeune enfant, les malades alitées ou ayant des difficultés pour avaler doit être prudente car elle peut être à l'origine de passage dans les bronches et de troubles respiratoires. D'une façon générale, ne pas administrer ce médicament avant de s'aliter.

Constipation occasionnelle :

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie (voyage). Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicée par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée) :

Elle peut être liée à deux causes :

- Soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin.
- Soit un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autres :

- Une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits,...)
- Une augmentation de la consommation d'eau et de jus de fruits
- Une augmentation des activités physiques (sport, marche, ...)
- Une rééducation du réflexe de défécation
- Parfois, l'adjonction de son à l'alimentation

Il est utile de prendre conseil auprès de votre médecin ou de pharmacien.

Cas particulier de l'enfant :

Chez l'enfant le traitement de la constipation est basé sur des mesures d'hygiène de vie et de diététique : notamment utilisation de la bonne quantité d'eau avec les poudres de lait infantiles, alimentation riche en produits d'origine végétale, adjonction de jus de fruits.

La prise régulière de laxatifs dans le jeune âge peut entraver le fonctionnement normal du réflexe de défécation.

NE PAS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE NI A LA VUE DES ENFANTS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Voie orale

Adulte : la posologie habituelle est 1 à 3 cuillères à soupe par jour.

Enfant de plus de 6 ans : 1 à 3 cuillères à café par jour.

Enfant de moins de 6 ans : selon avis médical

La prise peut avoir lieu en une ou plusieurs fois de préférence le matin à jeun, soit 2 heures avant ou après les repas. En cas de prise le soir, il faut éviter de s'aliter dans les 2 heures qui suivent (cf. Mises en garde) et de tenir compte que l'effet laxatif risque de survenir au cours de la nuit.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Dans des conditions exceptionnelles ou en raison d'une mauvaise utilisation, possibilités de troubles respiratoires.
- A forte dose, risque d'écoulement huileux ou d'irritation au niveau de l'anus ;

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION INDIQUEE EN CLAIR SUR L'EMBALLAGE
Ce médicament doit être conservé à l'abri de la lumière.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

juin 2004

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. - Immeuble Le Triton - 5 rue du Gabian - 98000 MONACO

B 2109 100 001-3