

PRINCI-B ®

Comprimé pelliculé

Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE

COMPOSITION

NITRATE DE THIAMINE ENROBE	257,73 mg
(quantité correspondante en NITRATE DE THIAMINE (Vitamine B1).....)	250,00 mg)
CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE ENROBE	51,55 mg
(quantité correspondante en CHLORHYDRATE DE PYRIDOXINE (Vitamine B6).....)	50,00 mg)
Excipients : Silice colloïdale anhydre, acide stéarique, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, hypromellose, laque aluminique de rouge cochenille A (E 124), dioxyde de titane (E 171), glycérol, cire de carnauba.	
Pour un comprimé pelliculé.	

FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé pelliculé, boîte de 30.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

VITAMINES (A. Appareil digestif et métabolisme)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

Ce médicament ne doit pas être utilisé :

- en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants,
- en association avec la lévodopa.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Ce médicament est contre-indiqué en association avec la lévodopa. AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE – ALLAITEMENT

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de poursuivre ce traitement. En cas d'allaitement, éviter de prendre ce médicament. D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque chez certains patients :
laque aluminique de rouge cochenille A (E124), glycérol.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

RESERVE A L'ADULTE.

1 à 3 comprimés par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un peu d'eau.

Ne pas utiliser plus de 4 semaines sans avis médical.

EFFETS INDESIRABLES

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT ENTRAINER CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : Manifestations neurologiques exceptionnelles et réversibles à l'arrêt du traitement suite à des fortes doses et / ou en cures prolongées.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

septembre 1998

NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT

S.E.R.P. - Immeuble Le Triton - 5 rue du Gabian - 98000 MONACO

5909 140 001