

# SINAPISME RIGOLLOT ®

## Sinapisme

**Ceci est un médicament. Lire attentivement la notice. Demander conseil à votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consulter votre médecin.**

RESERVE A L'ADULTE

### COMPOSITION

POUDRE DE GRAINE DE MOUTARDE NOIRE DESHUILEE.....1,285 g\*

Excipients : papier kraft blanchi frictionné à 120 g/m<sup>2</sup>, émulsion d'acétate de polyvinyle plastifié (Subo DL 22).

Pour un sinapisme de 81 mm x 119 mm

\* Quantité minimale pour obtenir une teneur en isothiocyanate d'allyle supérieure à 0,16 mg/cm<sup>2</sup>.

### FORME PHARMACEUTIQUE

Sinapisme, sachet de 10.

### CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE

RÉVULSIF (R : Système respiratoire)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament est utilisé comme décongestionnant au cours des affections respiratoires banales (rhumes, toux, bronchites simples) chez l'adulte.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Si la sensation de chaleur devient trop vive, il est conseillé d'arrêter le traitement.
  - En cas de fièvre, d'écoulement nasal purulent, d'expectoration purulente, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN.
  - Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses et les plaies.
  - En cas de réaction cutanée de type allergique ou irritatif, arrêtez le traitement.
  - Ne pas faire d'applications trop prolongées (15 minutes maximum).
- EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans le cas suivant :

- allergie au produit,
- maladies et lésions de la peau.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### MISES EN GARDE SPÉCIALES

En cas d'applications prolongées, l'apparition de brûlures est possible.

### GROSSESSE - ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

### COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Appliquer 2 à 3 sinapismes par jour. RÉSERVÉ A L'ADULTE.

Voie cutanée.

1. Tremper le sinapisme pendant quelques instants dans l'eau froide ou tiède. Le poser sur la partie à traiter (éviter les seins). Le maintenir avec une serviette sèche. Plusieurs sinapismes peuvent être placés les uns à côté des autres.
2. Laisser agir selon la tolérance du malade, jusqu'à ce que la peau prenne une coloration rouge et qu'une sensation de chaleur soit ressentie (8 à 15 minutes maximum).
3. La révulsion obtenue, retirer le sinapisme.

Ne pas dépasser 48 heures de traitement. Si les troubles persistent, consultez votre médecin.

### **EFFETS INDESIRABLES**

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

Possibilité d'irritation locale, de brûlures et de réaction allergique. Par ailleurs, il existe une rougeur cutanée normale au point d'application.

NE PAS HÉSITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

SIGNALEZ A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

### **CONSERVATION**

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

A conserver à l'abri de l'humidité.

### **DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE**

septembre 2005

### **NOM ET ADRESSE DU FABRICANT**

LABORATOIRES OMEGA PHARMA France - Usine Palluat - 07110 LARGENTIERE

### **NOM ET ADRESSE DE L'EXPLOITANT**

S.E.R.P. – Immeuble Le Triton - 5 Rue du Gabian - 98000 MONACO

B 8009 140 001-0